


把拔馬麻注意！ 新生兒腸病毒



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC



什麼是新生兒腸病毒



出生未滿一個月的新生兒，在孕婦生產前、分娩過程（或稱周產期）或出生後人際接觸期間感染腸病毒，稱為新生兒腸病毒感染

大多數新生兒腸病毒感染
都是輕微症狀或無症狀



中暑？

感冒？

流感？

腸胃炎？



且新生兒腸病毒感染臨床表現與
許多疾病相似，不一定會出現紅
疹、水泡或口腔潰瘍等症狀，因
此診斷有困難度

主要病毒種類

伊科病毒

6、9、11、19、30型

克沙奇B型病毒

B1、B2、B3、B4、B5型

潛伏期

2至15天 (平均3至5天)


傳染途徑



產道感染



胎盤感染



產後感染

常見症狀

發燒

喝奶量變少

活動力下降



重症表現



新生兒敗血症

發燒、肝脾腫大、貧血
嚴重時可能會發生呼吸
窘迫、休克等



心肌炎

新生兒感染克沙奇 B 型
，可能會併發心包膜炎
或心肌炎



腦炎/腦膜炎

躁動不安、食慾不振或
前囟門膨出，以及抽搐
、意識改變等腦炎症狀



肝炎

新生兒感染克沙奇 B 1
、B 3 型病毒，有機會
出現肝炎症狀，嚴重可
能發展為猛爆性肝炎、
急性肝細胞壞死

孕產婦該如何預防

產前篇



流行季節準媽媽避免出入
人潮擁擠和空氣不流通的
公共場合，並儘量不要接
觸病患



產前 1 4 天至分娩前後，
出現發燒、上呼吸道感染
、腹瀉、肋肌痛等症狀，
應主動告知醫師

孕產婦該如何預防

產後篇



生產後如疑似感染腸病毒
在症狀緩解以前，應避免
母嬰同室及接觸新生兒



哺乳期間如有不適，應徵
詢醫師是否繼續哺餵母乳


照顧者該如何預防



避免對新生兒
親親抱抱



家中大人小孩
如身體不適，
不接觸新生兒



家人、親友或醫護人員
接觸或照顧新生兒前應
用肥皂洗手，必要時應
更衣或佩戴口罩